

家庭園芸用
殺菌殺虫剤

農林水産省登録
第20849号

野菜と花の病気と虫に

病気と害虫に**W**効果 これ**1**本でOK!

サンヨール[®]液剤AL

DBEDC液剤



- うどんこ病
- べと病
- 葉かび病
- 灰色かび病
- 黒星病
- 白さび病

- アブラムシ類 ●ハダニ類
- チュウレンジハバチ
- アメリカシロヒトリ
- オンシツコナジラミ
- シルバーリーフコナジラミ
- チャドクガ ●イラガ類
- マイマイガ ●ナメクジ
- カイガラムシ ●ツノロウムシ

原体・製剤製造・総発売元

YCC 米澤化学株式会社

野菜や花の病気と害虫に一本で対応できる家庭用園芸殺菌殺虫剤

サンヨール[®]液剤AL

【成分】ドデシルベンゼンスルホン酸ビスエチレンジアミン銅錯塩[II] (0.040%)

有機溶剤・水・香料 (99.96%)

【性状】淡青紫澄明液体

●使用前にラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届くところに置かないでください。●使用後の空容器は3回以上洗浄してから環境に影響のないよう適切に処理してください。

【適用病害虫と使用方法】 ●希釈倍数：原液 ●使用方法：散布

▲ 効果・薬害等の注意

●ハウス又は露地栽培で高温時の場合には葉の変色等の薬害を生じるおそれがあるので、その場合は使用をさける。●多湿下の施設内で使用する場合は、散布した薬液が速く乾燥するように通気性をよくして散布する。●スターチス、パンジー、ペチュニア、プリムラを使用する場合、花弁に変色症状等の薬害が生じるので開花中は使用しない。●ナメクジ類に対して使用する場合は、薬液が虫体にかかるように散布する。●適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。●害虫防除の場合、本剤は界面活性系のため、虫体の気門閉塞作用によって殺虫効果を生じさせるので、十分量虫体にかかるように散布する。また、一度の散布で害虫が残った場合には改めて散布してください。

▲ 安全使用上の注意

●人に向かって噴射しない。●本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。●本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。●散布の際は保護眼鏡、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをする。●作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。●かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。●本剤を施設内で使用するとき、アルコール濃度が高いため特にアルコールに弱い体質の方は、揮発性ガスにより気分が悪くなったり、酔うおそれがあるので、換気を十分にする。●街路、公園等で使用する場合は、散歩中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。●水産動植物における影響については、この登録に係わる使用法では該当がない。●引火性があるので、火気に十分注意する。●風向きに注意し、散布液が自動車、壁、ペット、洗濯物、玩具などにかからないようにする。



▲ 保管上の注意

●火気をさけ、直射日光が当たらない低温な場所に密栓して保管する。●子供の手の届かない場所に保管する。●横向きにしないで立てて保管する。

製造元：米澤化学株式会社 本社

京都市南区唐橋芦辺町14番地

TEL (075)681-9526(代)

Fax (075)681-7377

http://www.yonezawa-chemical.co.jp/

作物名	適用病害虫	使用時期	本剤の使用回数	DBEDCを含む農薬の総使用回数
きゅうり	うどんこ病・べと病 アブラムシ類 ハダニ類・コナジラミ類	収穫前日まで	4回以内	4回以内
トマト ミニトマト	うどんこ病・葉かび病 灰色かび病 コナジラミ類 アブラムシ類・ハダニ類			
ピーマン	うどんこ病・アブラムシ類			
すいか メロン	うどんこ病 アブラムシ類・ハダニ類			
かぼちゃ	うどんこ病			
いちご	うどんこ病 アブラムシ類・ハダニ類	6回以内	6回以内	(定植前の苗浸漬は1回以内)
ばら	うどんこ病・黒星病 アブラムシ類 ハダニ類・ナメクジ類 チュウレンジハバチ	—	—	—
きく	白さび病・うどんこ病 アブラムシ類・ハダニ類 ナメクジ類	—	—	—
ペチュニア・スターチス プリムラ・パンジー	うどんこ病・アブラムシ類 ハダニ類・ナメクジ類	開花前まで	—	—
さるすべり	うどんこ病 アブラムシ類・ケムシ類 カイガラムシ類・イラガ類	—	8回以内	8回以内
まさき・さざんか	ツノロウムシ・ケムシ類 イラガ類			
つつじ類	ツツジグンパイ ツツジコナジラミ ケムシ類・イラガ類			
花き類・観葉植物 (ばら・きく・ペチュニア スターチス・プリムラ・パン ジーを除く)	うどんこ病・アブラムシ類 ハダニ類・ナメクジ類			
樹木類 (さるすべり・まさき さざんか・つつじ類を除く)	ケムシ類・イラガ類			
日本芝	葉腐病(ラージパッチ) さび病	—	—	—

取扱店