

# 農薬登録適用拡大内容のご案内

1. 農薬登録番号及び名称 第9625号 サンヨール

2. 農薬登録適用拡大登録取得年月日：平成25年10月23日付

農薬登録申請書第7項中次の事項を変更し、次のとおり改めました。

(変更事項)

1) ・作物名「きく」、「ばら」、「樹木類（つつじ類を除く）」、「つつじ類」、「花き類・観葉植物（きく、ばら、ペチュア、スターチス、プリムラ、パンジーを除く）」及び「日本芝」の使用時期「一」を「発生初期」に変更しました。

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生じるときは、その旨及び内容

なし

| 作物名  | 適用病害虫名  | 希釈倍数             | 使用液量             | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | DBEDCを含む農薬の総使用回数 |       |    |                             |                        |
|--|---|------------------|------------------|----------|---------|------|------------------|-------|----|-----------------------------|------------------------|
| 麦類   | うどんこ病   | 400～500倍         | 60～150ℓ<br>／10a  | 収穫14日前まで | 3回以内    | 散布   | 3回以内             |       |    |                             |                        |
| 小麦   | 赤かび病  | 400倍             |                  |          |         |      |                  |       |    |                             |                        |
| さやえんどう<br>実えんどう                              | うどんこ病<br>灰色かび病                                | 500倍             | 100～300ℓ<br>／10a | 収穫前日まで   | 4回以内    |      | 4回以内             |       |    |                             |                        |
| なす   | うどんこ病、すすかび病                                   | 700倍             |                  |          |         |      |                  |       |    |                             |                        |
| トマト<br>ミニトマト                                 | うどんこ病、葉かび病<br>灰色かび病、コジラミ類<br>アブラムシ類、ハダニ類      | 500倍             |                  |          |         |      |                  |       |    |                             |                        |
| ピーマン<br>甘長とうがらし                              | うどんこ病<br>アブラムシ類                               |                  |                  |          |         |      |                  |       |    |                             |                        |
| きゅうり   | べと病、うどんこ病<br>コジラミ類<br>アブラムシ類、ハダニ類             |                  |                  |          |         |      |                  |       |    |                             |                        |
| すいか<br>メロン<br>うり類(漬物用)                       | うどんこ病<br>アブラムシ類<br>ハダニ類                       |                  |                  |          |         |      |                  |       |    |                             |                        |
| かぼちゃ<br>ズッキーニ                                | うどんこ病   |                  |                  |          |         |      |                  |       |    |                             |                        |
| にがうり   | うどんこ病<br>アブラムシ類、ハダニ類                          |                  |                  |          |         |      |                  |       |    |                             |                        |
| いちご  | うどんこ病   | 500倍             |                  |          |         | —    |                  | 定植前   | 1回 | 瞬間～5分間<br>苗浸漬<br>5分間<br>苗浸漬 | 6回以内<br>(定植前の苗浸漬は1回以内) |
|  |   | 800倍             |                  |          |         |      |                  |       |    |                             |                        |
|  |   | 500～1000倍        |                  |          |         |      |                  |       |    |                             |                        |
|  | 灰色かび病<br>アブラムシ類、ハダニ類                          |                  |                  |          | 6回以内    |      |                  |       |    |                             |                        |
| きく   | うどんこ病、褐斑病<br>灰色かび病、白さび病<br>黒斑病<br>アブラムシ類、ハダニ類 | 500倍             | 100～300ℓ<br>／10a | 発生初期     | 6回以内    | 散布   | 8回以内             |       |    |                             |                        |
| ばら   | うどんこ病   | 500～1000倍        |                  |          |         |      |                  |       |    |                             |                        |
|  | 灰色かび病、黒星病<br>アブラムシ類、ハダニ類<br>チュウレンゾウハチ         | 500倍             |                  |          |         |      |                  |       |    |                             |                        |
| ペチュニア  | うどんこ病<br>灰色かび病<br>アブラムシ類、ハダニ類                 | 250～500倍         |                  |          |         |      |                  | 開花前まで |    |                             |                        |
|  | ナメタジ類   |                  |                  |          |         |      |                  |       |    |                             |                        |
| スターチス<br>プリムラ<br>パンジー                        | うどんこ病<br>灰色かび病<br>アブラムシ類、ハダニ類                 | 500倍             |                  |          |         |      |                  | 発生初期  |    |                             |                        |
| 花き類・観葉植物<br>(きく、ばら、ペチュニア、スターチス、プリムラ、パンジーを除く) | うどんこ病、灰色かび病<br>アブラムシ類、ハダニ類                    |                  |                  |          |         |      |                  |       |    |                             |                        |
| つつじ類   | うどんこ病、アブラムシ類<br>ツツジゲンハイ、ツツジコシラミ               |                  |                  |          |         |      |                  |       |    |                             |                        |
| 樹木類<br>(つつじ類を除く)                             | うどんこ病<br>アブラムシ類                               | 200～700ℓ<br>／10a |                  |          |         |      |                  |       |    |                             |                        |
| たばこ  | うどんこ病   | 25～180ℓ<br>／10a  |                  |          |         |      |                  | 2回以内  |    |                             |                        |
| 日本芝  | 葉腐病(ラージパッチ)<br>さび病                            | 300～500倍         | 0.5ℓ／㎡           | 8回以内     | 8回以内    |      |                  |       |    |                             |                        |

※今回の箇所は追加又は変更になった内容です。