

# 農薬登録適用拡大内容のご案内

1. 農薬登録番号及び名称 第9625号 サンヨール

2. 農薬登録適用拡大登録取得年月日：平成22年8月4日付

農薬登録申請書第7項中次の事項を変更し、次のとおり改め、別紙1の通り(変更前)を(変更後)とする。

(変更事項)

- 1) 作物名に「樹木類(つつじ類を除く)(うどんこ病、アブラムシ類)」を追加する。
- 2) 作物名「さるすべり(うどんこ病、カハカリゲマダラアブラムシ)」を削除する。
- 3) 作物名「つつじ類」の適用病害虫名「ツツジゲンバムシ」を「ツツジゲンハイ」とし、「うどんこ病」及び「アブラムシ類」を追加する。
- 4) 作物名「花き類・観葉植物(ペチュニア、スターチス、プリムラ、パンジーを除く)」を「花き類・観葉植物(きく、ばら、ペチュニア、スターチス、プリムラ、パンジーを除く)」に変更する。
- 5) 作物名「きく」の適用病害虫名に「うどんこ病」、「灰色かび病」、「アブラムシ類」及び「ハダニ類」を追加する。
- 6) 作物名「ばら」の適用病害虫名に「灰色かび病」、「アブラムシ類」及び「ハダニ類」を追加する。
- 7) 作物名「ペチュニア」の適用病害虫名に「灰色かび病」を追加する。
- 8) 作物名「スターチス」、「プリムラ」及び「パンジー」の適用病害虫名に「うどんこ病」を追加する。
- 9) 作物名「麦類」及び「小麦」の使用液量を「60~1500/10a」とする。
- 10) 作物名「さやえんどう」、「実えんどう」、「なす」、「トマト」、「ミニトマト」、「ピーマン」、「甘長とうがらし」、「きゅうり」、「すいか」、「メロン」、「うり類(漬物用)」、「にがうり」、「かぼちゃ」、「ズッキーニ」、「きく」、「ばら」、「ペチュニア」、「スターチス」、「プリムラ」、「パンジー」、「花き類・観葉植物(きく、ばら、ペチュニア、スターチス、プリムラ、パンジーを除く)」及び「いちご」の使用液量を「散布」の使用液量を「100~3000/10a」とする。
- 11) 作物名「樹木類(つつじ類を除く)」及び「つつじ類」の使用液量を「200~7000/10a」とする。
- 12) 作物名「たばこ」の使用液量を「25~1800/10a」とする。
- 13) 作物名「日本芝」の使用液量を「0.50/m<sup>2</sup>」とする。
- 14) 作物名「いちご」の使用液量「浸漬」の使用液量を「—」とする。

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	DBEDCを含む 農薬の総使用回数
樹木類	うどんこ病 アブラムシ類	500倍	—	8回以内	散布	8回以内

4. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生じるときは、その旨及び内容

なし

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用濃度	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DBEDCを含む農薬の総使用回数						
麦類	うどんこ病	400~500倍	<b>60~150g / 10a</b>	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内						
小麦	赤かび病	400倍											
さやえんどう 実えんどう	うどんこ病 灰色かび病	500倍	<b>100~300g / 10a</b>	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内						
なす	うどんこ病、すすかび病	700倍											
トマト ミニトマト	うどんこ病、葉かび病 灰色かび病、コジラミ類 アブラムシ類、ハダニ類	500倍											
ピーマン 甘長とうがらし	うどんこ病 アブラムシ類												
きゅうり	べと病、うどんこ病 コジラミ類 アブラムシ類、ハダニ類												
すいか メロン うり類(漬物用)	うどんこ病 アブラムシ類 ハダニ類												
かぼちゃ ズッキーニ	うどんこ病												
にがうり	うどんこ病 アブラムシ類、ハダニ類												
いちご	うどんこ病							500倍	=	定植前	1回	瞬間~5分間 苗浸漬 5分間 苗浸漬	6回以内 (定植前の苗浸漬は1回以内)
								800倍					
		500~1000倍											
	灰色かび病 アブラムシ類、ハダニ類												
<b>きく</b>	<b>うどんこ病</b> 、褐斑病 <b>灰色かび病</b> 、白さび病 黒斑病 <b>アブラムシ類、ハダニ類</b>	500倍											
<b>ばら</b>	うどんこ病	500~1000倍	<b>100~300g / 10a</b>	-	-	-	-						
	<b>灰色かび病</b> 、黒星病 <b>アブラムシ類、ハダニ類</b> チュウリンジハバチ	500倍											
<b>ペチュニア</b>	うどんこ病 <b>灰色かび病</b> アブラムシ類、ハダニ類	250~500倍	<b>100~300g / 10a</b>	開花前まで	8回以内	散布	8回以内						
	ナメタジ類	250~500倍											
<b>スターチス</b> <b>プリムラ</b> <b>パンジー</b>	<b>うどんこ病</b> 灰色かび病 アブラムシ類、ハダニ類	500倍	<b>100~300g / 10a</b>	-	-	-	-						
<b>花き類・観葉植物</b> ( <b>きく、ばら、ペチュニア、メダカ</b> <b>スズメバチ、ハダニを除く</b> )	うどんこ病、灰色かび病 アブラムシ類、ハダニ類												
<b>つつじ類</b>	<b>うどんこ病</b> 、 <b>アブラムシ類</b> ツツジゲンハイ、ツツジコジラミ												
<b>樹木類</b> ( <b>つつじ類を除く</b> )	<b>うどんこ病</b> <b>アブラムシ類</b>												
たばこ	うどんこ病		<b>25~180g / 10a</b>		2回以内		2回以内						
日本芝	葉腐病(リーフパッチ) さび病	300~500倍	<b>0.5g / m<sup>2</sup></b>		8回以内		8回以内						

**※今回** の箇所は追加又は変更になった内容です。